

## Zakaj je pomemben pogovor o gostoti vaših dojk?

1. Gostoto dojk se določi z mamogramom in se opiše kot ena od štirih kategorij:

- (A) maščobna;
- (B) razpršena fibroglandularna gostota;
- (C) heterogeno gosta; ali
- (D) izredno gosta




(C) Heterogeno goste ali (D) Izredno goste veljajo za „goste dojke“

2. Goste dojke so normalne. 40 % žensk, starejših od 40 let, ima goste dojke.
3. Čeprav je normalno, je gosto tkivo dojke dejavnik tveganja za razvoj raka dojke. Gostejše so dojke, večje je tveganje.

4. Mamografija ostaja standardni presejalni test za raka dojke, vendar se lahko rak v gostih dojkah pri mamografiji skriva in ostane neopažen, dokler ni večji in so možnosti, da se je razširil, večje.

Rak na mamogramu maščobne dojke v primerjavi z gosto dojko



5. Drugi presejalni testi, kot sta ultrazvok ali MRI (magnetna resonanca), skupaj z mamografijo znatno povečata odkrivanje raka dojke v zgodnji fazi pri ženskah z gostimi dojkami.

**DenseBreast-info.org je medicinska spletna stran, oblikovana za zagotavljanje izobraževanja o gostoti dojk.**

PRIČUJOČE GRADIVO NI NAMENJENO KOT ZDRAVNIŠKI NASVET. ČE IMATE KAKRŠNO KOLI VPRAŠANJE GLEDE SVOJEGA ZDRAVJA, VAS PROSIMO, DA STOPITE V STIK Z USPOSOBLJENIM ZDRAVNIKOM.